

Determinarea profilelor de concentrație volumică din date de teledetecție optică utilizand metoda LIRIC

- Student: Cristina Antonia Marin
- Coordonatori științifici: Ș.L. Dr. Liliana Preda
C.Ș. I Doina Nicolae


Cuprins

- Introducere
- Atmosfera și interacția acesteia cu radiația electromagnetică
- Tehnici de investigare
- Algoritm pentru determinarea profilelor verticale de concentrație volumică a aerosolilor din date Lidar și de fotometrie
- Rezultate experimentale
- Concluzii
- Bibliografie

Motivație

- Determinarea concentrației aerosolilor
- Aerosol- definiție
- Studii sănătate, mediu, climatologie
- Utilizare Liric- LIdar Radiometer Inversion Code
 - Determinarea concentrațiilor volumice și variația acestora pe verticală

Lidar




- RCS
- Depolarizare volumică
- Variația pe altitudine și în timp a straturilor

Fotometru solar

- Principiu
- Moduri măsurare
- AERONET
- Valori pentru întreaga coloană



[<http://www.enviroscopy.ro/en/produse/automatic-sun-tracking-photometer/attachment/ce318-nasa/>]





Liric

- Algoritm ce folosește date de Lidar și fotometru
- Determină concentrația și distribuția pe altitudine
- Aerosolii sunt împărțiți în fini și grosieri sferici și nesferici
- Principiu
- Parte de preprocesare
- Parte de procesare

Etape procesare Liric

- Convertirea NetCDF -> MDB
- Synthesizer
 - Medieri semnal lidar
 - Lipire analog+ numărare fotoni
 - 3 sau 4 semnale mediate
- TropoExport
 - Limita inferioară, superioară, punct de calibrare
 - semnal util
- Manual Retriever
 - Parametrii
 - profilele concentrațiilor volumice



A software dialog box titled "Manual retrieval parameters" with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into several sections for parameter configuration.

Weighting coefficients

Lidar signals:

- $k_{335} =$
- $k_{532} =$
- $k_{1064} =$
- $k_{532,L} =$

Total concentrations:

- $f_{fine} =$
- $f_{spherical} =$
- $f_{spheroid} =$
- $f_{coarse} =$

Concentration smoothnesses:

- $d_{fine} =$
- $d_{spherical} =$
- $d_{spheroid} =$
- $d_{coarse} =$

Polarization parameters

Molecular depolarization:

- $X_{532} =$

Parallel leakage:

- $\mu_{532} =$

Optimization options

Function tolerance:

- $Tol_{Fun} =$

Parameter tolerance:

- $Tol_x =$

Photometer parameters



Altitude displacement (m):

- $\Delta h_{photo} =$

Buttons:

Liric


- Suprapunerea semnalelor Lidar calculate cu cele măsurate
- Valorile calculate pentru concentrațiile particulelelor fine și grosiere nu diferă cu mai mult de 5% față de cele declarate de Aeronet.




Rezultate experimentale

- Studiu caz 8 -9 iunie 2012
- Studiu caz 24 septembrie 2012
- Stabilitatea soluției
- Influență sincronizării temporale


Studiu de caz 8-9 iunie 2012



NOAA HYSPLIT MODEL
Backward trajectories ending at 1100 UTC 08 Jun 12
GDAS Meteorological Data






NOAA HYSPLIT MODEL
Backward trajectories ending at 1700 UTC 09 Jun 12
GDAS Meteorological Data



Rezultate studiu de caz 8-9 iunie


- >2 km
 - Amestec particule fine și grosiere
 - Aerosol urban
- 1 km
 - Amestec particule fine și grosiere
 - Concentrație mare de particule fine
 - Aerosolul provine din regiuni apropiate
 - Focuri în Sudul României
 - > fum
- Amestec particule fine, grosiere sferice, grosiere nesferice
 - Praf saharian
 - Fum
 - Aerosol marin

Studiu de caz 24 septembrie 2012






NOAA HYSPLIT MODEL
Backward trajectories ending at 1200 UTC 24 Sep 12
GDAS Meteorological Data




NOAA HYSPLIT MODEL
Backward trajectories ending at 1600 UTC 24 Sep 12
GDAS Meteorological Data




Rezultate studiu de caz 24.09

- Evoluția straturilor în timp
- Amestec particule fine și grosiere sferice, sferoide
- Praf saharian
- Fum


Stabilitatea soluției




Stabilitatea soluției



Influența sincronizării temporale



Influența sincronizării temporale



Concluzii

- Am determinat profilelor verticale ale concentrațiilor particulelor fine și grosiere: sferice și sferoide și evoluția acestora în timp
- Analizarea stabilității soluției la variația parametrilor introduși de utilizator k , f
- Algoritmul oferă soluții doar în cazul unei atmosfere stabile, fără nori
- Am remarcat probleme ale softului când gradul de sfericitate al particulelor este extrem (conform Aeronet este sub 10 % sau peste 90%)
- Stabilitate mai mică a soluției pentru cazul în care se folosește canalul lidar 532 nm perpendicular
- Metodă laborioasă
- Studii viitoare

Bibliografie

- Nicolae, D.: Tehnici lidar pentru caracterizarea aerosolilor din atmosfera joasă, Tehnopress, 2013
- Wagner J., A. Ansmann, U. Wandinger, P. Seifert, A. Schwarz, M. Tesche, A. Chaikovsky, O. Dubovik, “Evaluation of the lidar/radiometer inversion code (LIRIC) to determine microphysical properties of volcanic and desert dust”, *Atmos. Meas. Tech.* **6**, 1707-1724 ,2013
- Granados Munoz M. J, Characterising the atmospheric aerosol by active and passive remote sensing: microphysical properties and hygroscopic growth effects, Ph. D, Dissertation, Universidad de Granada, 2014
- Filioglou, M., Sensitivity Study of LIRIC Algorithm using Thessaloniki's Lidar data, MASTER THESIS, Aristotel University of Thessaloniki's, 2015



Vă mulțumesc pentru atenție!